

Objectif : Adopter un comportement responsable afin de prévenir les IST.

Généralités sur les IST.

Une infection sexuellement transmissible est définie comme étant une infection dont les agents responsables sont exclusivement ou préférentiellement transmis par **voie sexuelle** et qui justifie de la prise en charge du ou des partenaires.

La principale voie de transmission des IST est sexuelle mais elle peut être aussi sanguine (seringue, tatouage etc.) et/ou materno-fœtale (grossesse, accouchement, allaitement).

Comment reconnaître une IST symptômes: brûlure en urinant, perte anormale, plaie, boutons etc.

1 Cas particuliers SIDA (VIH) / Hépatite B (HBV).

	<u>SIDA</u>	<u>Hépatite B</u>
Nb cas dans le monde	35 millions de séropositifs (1.5 millions décès en 2013)	350 millions de porteurs (pasteur) (780 000 décès en 2013)
Nb cas en France (F)	150000	300 000
Mode de contamination	Sexuel, sanguin, maternofoetal	Sexuel, sanguin, maternofoetal
Origine Nom du responsable	Virus VIH Virus Immuno déficience Humaine	Virus
Symptômes principaux	Asymptomatique (aucun symptôme) ou fatigue, amaigrissement	Asymptomatique ou fatigue générale, atteinte du foie
Conséquences	Cancer, pneumonie, mort	Jaunisse, cancer du foie
Prévention	Préservatif	Vaccin, préservatif
Traitement curatif	Incurable	

Le virus de l'hépatite B est 50 à 100 fois plus infectieux que celui du SIDA.

2- Conduites à tenir à la suite d'une prise de risque.

La plupart des IST se traitent avec des médicaments

- Informer son partenaire.
- Se rendre chez le médecin ou aux urgences.
- Suivre le traitement prescrit.
- Faire un dépistage.
- Se protéger lors de nouveaux rapports.



3- Prévention des IST.

Moyens de prévention	Justifications
+ <u>Préservatif</u>	Barrière physique entre le microbe et l'organisme.
↓ Vaccin (hépatite B et papillomavirus)	Permet à l'organisme de fabriquer des anticorps capables de se protéger en cas d'infection.
↓ Se faire dépister	- Intervenir rapidement si le test est positif.
- Informer son partenaire	Stoppe la chaîne possible de propagation des IST.



4- Structures d'accueil, d'aide et de soutien.

Planning familial 334 bis avenue Thiers 33000 Bordeaux Tel 05 56 44 00 04 mfpf-ad33@wanadoo.fr

Centre dépistage anonyme et gratuit 2 rue du moulin rouge Bordeaux Tél. 05.57.22.46.66

Maison départementale de la solidarité et de l'insertion

419, Av. de Verdun - Mérignac (10 min à pied du lycée) 05 56 12 13 90

éjà enceinte et donc la contraception n'a pas été efficace ou absente.