

Objectif : Adopter un comportement responsable afin de prévenir les IST.

Généralités sur les IST.

Une **infection sexuellement transmissible** est définie comme étant une infection dont les agents responsables sont exclusivement ou préférentiellement transmis par **voie sexuelle** et qui justifient de la prise en charge du ou des partenaires.

La principale voie de transmission des IST est **sexuelle** mais elle peut être aussi **sanguine** (seringue, tatouage etc.) et/ou **materno-fœtale** (grossesse, accouchement, allaitement).

1 Les principales IST.

	<u>SIDA</u>	<u>Hépatite B</u>	<u>Syphilis</u>	<u>Chlamydie</u>
Mode de contamination	Sexuel sanguin maternofoetal	Sexuel sanguin maternofoetal	Sexuel (maternofoetal)	Sexuel (maternofoetal)
Origine Nom du responsable	Virus VIH Virus Immuno déficience Humaine	Virus (HBV)	Bactérie (Treponema pallidum)	Bactérie chlamydia
Symptômes principaux	Asymptomatique fatigue, amaigrissement	Asymptomatique fatigue générale, atteinte du foie	Abcès, puis des boutons sur tout le corps	Asymptomatique brûlures, écoulement
Conséquences	Cancer, pneumonie, mort	Jaunisse, cancer du foie dans certains cas.	Atteinte cérébrale, des nerfs, du cœur.	Risques de salpingite, stérilité
Prévention	Préservatif	Vaccin, Préservatif	Préservatif	Préservatif
Traitement	Incurable (à vie)	Incurable	Antibiotique	Antibiotique

Le virus de l'hépatite B est **50 à 100 fois plus infectieux que celui du SIDA**.

Parmi les IST non listées dans le tableau il y a entre autres: le condylome, l'herpès génital, la blennorragie.

2- Conduites à tenir à la suite d'une prise de risque.

La plupart des IST se traitent avec des **médicaments**


- Informer son partenaire.
- Se rendre chez le médecin ou aux urgences.
- Suivre le traitement prescrit.
- Faire un dépistage.
- Se protéger lors de nouveaux rapports.

STOP aux IST*!

* Infections Sexuellement Transmissibles



PARLEZ-EN



PROTÉGEZ-VOUS



DÉPISTEZ-VOUS ET SOIGNEZ-VOUS

3- Prévention des IST.

Moyens de prévention	Justifications
+ Préservatif	Barrière physique entre le microbe et l'organisme.
Vaccin (hépatite B et papillomavirus)	Permet à l'organisme de fabriquer des anticorps capables de se protéger en cas d'infection.
Se faire dépister	- Intervenir rapidement si le test est positif.
- Informer son partenaire	Stoppe la chaîne possible de propagation des IST.



4- Structures d'accueil, d'aide et de soutien.

Planning familial 334 bis avenue Thiers 33000 Bordeaux Tel **05 56 44 00 04** mfpf-ad33@wanadoo.fr

Centre dépistage anonyme et gratuit 2 rue du moulin rouge Bordeaux Tél. 05.57.22.46.66

Maison départementale de la solidarité et de l'insertion

419, Av. de Verdun - Mérignac (10 min à pied du lycée) **05 56 12 13 90**